

Nombre Comercial	Tipo de vacuna	Composición	Vía administración	Presentación	Indicación	Dosis	Pauta*	Forma reconstitución
<b>FOCETRIA</b> (Novartis)  	Antígenos de superficie	7,5 µg por 0,5 ml	 Intramuscular en deltoides o en cara anterolateral del muslo	<b>Monodosis</b>  En jeringa precargada	<b>6 meses a 9 años</b> 0,5 ml	2 dosis (0, 21 días)	No se reconstituye	
				<b>Multidosis</b>  Frasco con 10 dosis de antígeno H1N1	<b>10- 17 años</b> 0,5 ml	1 dosis		
<b>PANDEMRIX</b> (GSK)  	Virus gripe fraccionados inactivados  Cultivado en huevo embrionado	3,75 µg por 0,5 ml	 Intramuscular en deltoides o en cara anterolateral del muslo	<b>Multidosis</b>  Pauta con 800 dosis: 2 cajas con adyuvante (2 x 20 viales) 1 caja de antígeno (1 x 80 viales)	<b>&gt;65 años</b> 0,5 ml	1 dosis	<b>UTILIZAR EN 24 h TRAS APERTURA</b>   1. Mezclar: + 1 val emulsión + 1 val suspensión (10 dosis) 2. Agitar 3. Cargar: 1 dosis = 0,5 ml Cambiar agua Agitar antes de cada administración  <b>UTILIZAR EN 24 h TRAS RECONSTITUCIÓN</b>	
				<b>Multidosis</b>  Frasco con 10 dosis de antígeno	<b>18-65 años</b> 0,5 ml	1 dosis		

\*Las pautas vacunales de 1 dosis son provisionales a la espera de las fichas técnicas definitivas de la EMEA